

Alimentation de substitution et contention des Martinets

Vous avez trouvé un martinet et vous êtes dans l'incapacité de l'amener dans un centre de sauvegarde agréé : ce guide est fait pour vous.

Vous trouverez dans ces pages quelques conseils pour installer et nourrir l'oiseau secouru. Il est primordial de connaître l'alimentation naturelle de l'animal afin de déterminer quelle alimentation de substitution pourra lui être donnée. **Soyez vigilants sur le dosage des aliments afin de ne pas trop nourrir l'animal.** Cela pourrait entraîner des difficultés de digestion et, dans le pire des cas, la mort de l'animal.

IMPORTANT

L'alimentation proposée dans ce guide **ne peut être que provisoire.** Elle n'est en aucun cas adaptée au long terme. En effet, **elle s'apparente à du *fast-food* et aurait des répercussions irréversibles sur la croissance et le bon développement de l'animal.**

Ce guide a été réalisé afin de répondre à une situation d'urgence et a pour but de vous aider à maintenir l'animal en vie durant quelques jours. Au-delà, la détention de l'animal dans de telles conditions entraînera petit à petit son déclin. Pensez-y : une cage dorée n'est jamais aussi belle que la liberté !

A BANNIR

- Pain
- Brioche
- Pâtisserie
- Viennoiserie
- Lait
- Sucre
- Jaune d'œuf
- Viande cuite et/ou épicée
- Légumes secs cuits
- Chips/biscuits salés



HIRONDELLES ET MARTINETS

Ce qu'il faut savoir

3 Classes d'âge :

- Poussin en duvet
- Poussin en émancipation
- Adulte

Alimentation en centre de soins :

- Grillons noyés
- Vers de farine noyés
- Teignes de ruche

Alimentation de substitution :

- Steak haché **cru**
- Croquettes (chatons de préférence) réhydratées : les croquettes sont prêtes lorsque vous sentez que le cœur de la croquette est moelleux.

Précautions :

- . Pour faire boire l'oiseau, il faut lui tremper le bout du bec dans une soucoupe d'eau. Attention à ne pas immerger les narines de l'oiseau ! Il boira s'il en ressent le besoin. Autre solution : trempez l'aliment dans un fond d'eau et, avant le nourrissage, déposez-le rapidement sur un tissu afin de retirer le surplus d'eau.
- . Donnez les aliments à la main à l'aide du pouce et de l'index.
- . Le steak doit être cru et à température ambiante
- . Faites une boulette avec la viande et la tremper dans l'eau avant de la donner à l'oiseau. Prenez garde aux gouttes d'eau qui pourraient couler dans les bronches !
- . **Toujours maintenir le plumage de l'animal PROPRE**, quitte à mettre un « bavoir » à l'oiseau. Un plumage sale et grasseyé peut entraîner la mort de l'oiseau !

Les hirondelles

- . **Les jeunes** doivent être stimulés : il faut proposer l'aliment en le frottant sur la commissure et la pointe du bec tout en sifflant et/ou faire tomber l'aliment devant eux pour piquer leur curiosité. Une fois le bec ouvert, placez l'aliment au fond de leur gorge à l'aide de votre index afin de les inciter à avaler. Si l'oiseau est récalcitrant ouvrir le bec délicatement à l'aide du pouce et de l'index. Prenez garde à ne pas tordre le bec et à ne pas mettre vos doigts dans ses yeux.
- . **Les adultes** n'ouvrent pas spontanément le bec, il faut donc les y forcer, avec délicatesse, à l'aide du pouce et de l'index. Prenez garde à ne pas tordre le bec de l'oiseau et à ne pas lui mettre les doigts dans les yeux.

Les martinets, jeunes et adultes

- Les martinets ne mangent qu'en vol et se nourrissent rarement en captivité. Il faut donc, comme pour les hirondelles, ouvrir délicatement le bec, à l'aide du pouce et de l'index. Prenez garde à ne pas tordre le bec de l'oiseau et à ne pas lui mettre les doigts dans les yeux.



Installation :

Dans un carton suffisamment grand pour que l'animal puisse se tenir debout.

Litière : journal et serviette qu'il faut changer tous les jours.

Utiliser une corbeille ou autre pour faire un faux nid .

Mettre une grille de frigo ou un grillage pour fermer le dessus du carton. Cela permet également de laisser entrer la lumière du jour dans le carton.

Uniquement pour les poussins nus : mettre une bouillotte entourée d'un linge dans un coin du carton pour que l'oiseau puisse sans éloigner s'il a trop chaud. Il faut la changer toutes les 4h. Si vous n'avez pas de bouillote, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau et la glisser dans une chaussette. A changer également toutes les 4h.

Uniquement pour les jeunes en émancipation et les adultes : mettre une branche qui traverse le carton de part en part afin qu'ils puissent se percher.

Pour les martinets ou les très jeunes hirondelles



Pour les hirondelles en émancipation ou adultes



Les bouillotes, industrielles ou artisanales



Tableau d'alimentation des hirondelles et martinets

Espèces	Classes d'âge	Taille des aliments	Quantité par repas	Nombre de repas par jour
Martinet	Poussin en duvet	Taille d'un noyau de cerise	3 à 4 boulettes par repas	14 repas à 1h00 d'intervalle
	Poussin en émancipation	Taille d'un noyau de cerise	6 à 10 boulettes par repas	7 repas à 2h00 d'intervalle
	Adulte	Taille d'un noyau de cerise	6 à 10 boulettes par repas	4 à 5 repas à 3h00 d'intervalle
Hirondelle	Poussin en duvet	Taille d'une tête d'épingle	3 à 4 boulettes par repas	14 repas à 1h00 d'intervalle
	Poussin en émancipation	Taille d'une tête d'épingle	6 à 10 boulettes par repas	7 repas à 2h00 d'intervalle
	Adulte	Taille d'une tête d'épingle	6 à 10 boulettes par repas	4 à 5 repas à 3h00 d'intervalle

Quelques informations supplémentaires

Nous espérons que ce guide vous permettra de maintenir en vie l'animal secouru jusqu'à sa prise en charge par des professionnels. Si, malheureusement, celui-ci décède durant son séjour chez vous, cela ne signifie pas forcément que vous vous êtes mal occupé de lui. Il peut avoir subi un choc traumatique avant que vous ne le découvriez ou souffrir d'une blessure interne que vous ne pouviez pas diagnostiquer... Comme pour les humains, la mort d'un animal ne peut pas toujours s'expliquer car nous ne connaissons pas ses antécédents ni ses expériences passées. Si l'animal présente une fracture, il doit être pris en charge le plus rapidement possible avant que les os ne commencent à se consolider.

Secourir un animal blessé est une preuve d'empathie envers la faune sauvage. Faire en sorte qu'il reste sauvage pour le rendre à la nature sans dépendance à l'homme est une véritable preuve de bienveillance !

◆ Des fausses idées à oublier

Nous prêtons plus facilement l'instinct parental aux mammifères, pourtant, les oiseaux sont également d'excellents parents ! Ils n'abandonnent jamais leur progéniture, même au péril de leur vie. Un humain ou un animal peut avoir mis son odeur sur leurs petits, ils continueront malgré tout de s'en occuper. C'est pourquoi, n'ayez pas le réflexe de ramasser tous les jeunes oiseaux trouvés au sol ! Contactez-nous avant tout ou référez-vous au guide *Remplacement oiseau* et *Remplacement Ecureuil* que vous pourrez prochainement trouver sur notre site. Il suffit parfois de replacer l'oiseau en hauteur. Vous ne le mettez pas en danger, au contraire ! Vous lui offrez une merveilleuse opportunité : celle d'avoir une éducation complète et l'attention de ses parents. Enfin, les oiseaux ne choisissent pas le lieu de ponte au petit bonheur la chance. La nature, au contraire, est très bien faite. Si les parents ont choisi cet endroit, c'est qu'il convient parfaitement à l'élevage de leurs petits.

◆ Quand je trouve un oiseau, je ne dois pas...

◆ Parler, exhiber ou faire des câlins à l'oiseau pour le rassurer

Cela ne fera effectivement que le stresser davantage. Certaines espèces sont très sensibles au stress et peuvent mourir d'arrêt cardiaque dans vos mains.

◆ Le placer dans une cage en plein milieu du salon

L'oiseau aura besoin de calme et de tranquillité pour se remettre ou ne pas aggraver ses blessures. Choisissez une pièce isolée ou peu fréquentée et couvrez la cage, le carton ou la caisse afin de ne pas empirer son état.

Attention

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les conseils donnés par des professionnels doivent être suivis à la lettre.

Dans le cas d'un mauvais remplacement (trop tardif, gîte mal fixé, etc.), les petits ne pourront être récupérés par les parents et seront abandonnés.

Si vous décidez de les garder et de les élever, sachez que les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont nombreuses : carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie, etc. Cela peut entraîner un handicap physique ou la mort de l'animal. Enfin, comme les humains, les animaux apprennent de leurs parents par mimétismes. Un animal élevé par un humain, sans représentant de son espèce, n'est donc pas sans conséquences et peut engendrer un handicap social qui l'empêchera de trouver une place au sein de ses congénères.



La Faune Sauvage et la Loi

La détention d'animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le Centre de Sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.

Nous contacter

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage LPO Hérault

15 rue du Faucon crécerellette
Route de Loupian, Les Cigales
34560 Villeveyrac

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour partager vos expériences

<http://herault.lpo.fr/>
<https://www.facebook.com/CRSFS34/>



FAUNE EN DETRESSE - CENTRE DE LA LPO HERAULT